

## HEMINEFRECTOMIA POR LITIASIS (\*)

Dr. Jorge Lockhart

La resección parcial renal está actualmente en boga para obtener la curación radical de las lesiones determinadas por la litiasis que conducen a las consiguientes alteraciones de las cavidades excretorias y del propio parénquima. De esa manera se obtiene una seguridad mayor en cuanto al pronóstico y el porcentaje de recidivas disminuye extraordinariamente.

Pero no siempre es posible esa terapéutica que se resume a los casos de litiasis muy limitadas y con el resto del sistema renopielo - ureteral normal.

El caso que presentamos es ideal en ese sentido. Se trata de una litiasis en un riñón doble.

El pielograma combinado con el neumo - retro - peritoneo, señalaban la malformación congénita bilateral y la litiasis del tipo coraliforme ocupando el hemi - riñón superior derecho.

Se practicó la intervención quirúrgica, aislando los pedículos vasculares y el uréter correspondiente al hemi - riñón patológico. Ligada la arteria, se constituyó el infarto regional correspondiente, y la heminefrectomía se practicó en zona exangüe.

El pielograma post - operatorio demuestra la restitución a una situación de normalidad del riñón restante y la evolución clínica muy favorable confirmó el buen resultado de la intervención.

---

(\*) Trabajo presentado en la Sociedad de Cirugía en la ½ hora previa el día 7 de abril de 1954.




FIG. 1. — Radiografía simple.




FIG. 2. — Pielograma y neumo-retro peritoneo pre-operatorios.




FIG. 3. — Radiografía de la pieza operatoria.




FIG. 4. — Pielograma post - operatorio.