


LUXACION TRAUMATICA DE LA ARTICULACION DE LISFRANC

Armando M. LOUBEJAC

Presentado a la sesión del 6 de agosto de 1941

Como lo había prometido en la sesión en que el Dr. H. Cagnoli hizo su comunicación sobre "*Luxación - fractura de la articula-*



ción de Lisfranc", traigo a consideración de los señores consocios una observación personal de luxación pura de todos los metatarsianos hacia afuera y arriba, con discreta diastasis entre la 1ª y la 2ª cuña.

OBSERV. 1. — A. M., de 19 años, uruguayo, ingresa a mi guardia del Hospital Maciel el día 10 de Octubre de 1939, a las 17 horas; ha caído de pie desde 4 metros de altura, saltando de una pared. Tumefacción redondeada del antepié derecho con infiltración sanguínea difusa. Dolor intenso en la articulación de Lisfranc. Marcada saliencia de la apófisis del 5º metatarsiano y depresión acentuada del borde interno del pie, delante de la primera cuña. Sobre el dorso se palpan los metatarsianos luxados. Una radiografía de frente y de perfil, placa E 14463, Hosp. Maciel (fig. 1) confirma los datos semiológicos. Se intenta la reducción manual, previa infiltración de novocaína al 2 % en la articulación de Lisfranc. Como el enfermo sufre, se hace una anestesia general al éter CO², lográndose fácilmente la reducción. Yeso circular en toda la pierna que se cambia al mes. Nuevo yeso durante 45 días. Curación.

He visto al enfermo el 17 del corriente mes: camina perfectamente, conserva un arco plantar igual al del pie sano, no ha tenido nunca dolores y sólo presenta como reliquia de su luxación un ligero engrosamiento tarso - metatarsiano y un poco de rigidez en los movimientos a ese nivel.