

*VESICULA DOBLE **

Prof. Dr. Emilio Andreón

Presento a la Sociedad de Cirugía la radiografía de una pieza operatoria. Se trata de una vesícula doble, con dos císticos desembocando separadamente en la vía biliar principal con litiasis en ambas vesículas.



La radiografía ha sido obtenida luego de inyectar aire en uno de los císticos y yoduro de sodio en el otro, pudiendo con esa maniobra evidenciar la total separación de ambas vesículas.

La radiografía ha sido obtenida luego de inyectar aire en uno de los císticos y yoduro de sodio en el otro, pudiendo con esa maniobra evidenciar la total separación de ambas vesículas.

La pieza corresponde a una enferma que me consultó por cólicos hepáticos repetidos y a la cual el estudio previo a la operación reveló la existencia de una exclusión vesicular.

La presentación de esta pieza responde a dos razones: En primer término, al deseo de enriquecer la casuística con una lesión en extremo rara. La segunda razón es más importante, pues se trata de llamar la atención sobre los inconvenientes prácticos

de 1947.

(*) Esta comunicación fué presentada en la sesión del 14 de mayo de 1947.

que significa la existencia de la disposición anatómica que comento. Los cuerpos y basinetes aparentaban una vesícula única, no habiendo ningún dato de observación que permitiera sospechar la existencia de un doble órgano. Por esa razón luego de la disección, ligadura y sección de uno de los císticos, sólo una cuidadosa y difícil disección, pudo convencerme de que no me encontraba frente a un canal hepático derecho anormal. De haber sospechado el tipo anatómico de la vesícula me habría bastado incidir el peritoneo visceral, lo que habría sido bien fácil, tal como lo hice después, con el fin de obtener la radiografía que presento.