Sr. COORDINADOR.—Tienen la palabra los Dres. Jorge Dighiero, César V. Aguirre, Joaquín Purcallas, José M. Baldomir, Eduardo Joaquín Canabal, Carlos V. Suzacq y José Oscar Horjales.

ESTUDIO ANGIOCARDIOGRAFICO DE LOS QUISTES HIDATICOS DEL VENTRICULO IZQUIERDO

Dres. Jorge Dighiero, César V. Aguirre, Joaquín Purcallas,
José M. Baldomir, Eduardo Joaquín Canabal, Carlos V. Suzacq
y José Oscar Horjales.

Hasta el momento de publicar nuestras dos primeras observaciones de quiste hidático del ventriculo izquierdo^{1,2} no habíamos encontrado ninguna ficha bibliográfica que se refiriera al estudio angiocardiógrafico de la equinococosis cardíaca. Dado lo nuevo del método y teniendo en cuenta la relativa rareza de la afección, es fácil explicarse el por qué.

Creemos, por lo tanto, haber sido los primeros en habernos ocupado del estudio angiocardiógrafico de la equinococosis no complicada del ventriculo izquierdo y de la equinococosis cardíaca en general. Nos consta que Sapriza y Armand Ugon^{3,4} emplearon —en nuestro pais y con posterioridad a nosotros— este metodo para estudiar un caso suyo de equinococosis de la aurícula derecha. Perez Fontana y Sapriza⁵ también estudiaron su observación de quiste hidático hialino del ventriculo izquierdo desde el punto de vista angiocardiógrafico. Recientemente Armand Ugon, Purriel y Sapriza estudiaron por el método angiocardiógrafico un caso de quiste hidático de la aurícula derecha, que fué operado con todo éxito por Crafoord.⁶

Desde la época de nuestras primeras publicaciones sobre casos de equinococosis "cerrada" del ventriculo izquierdo hasta el mo-

¹ Trabajo de la Clinica Medica del Prof. Dr. Fernando Herrera Ramos (Facultad de Medicina) y del "Centro de Estudios Superiores de Medicina Interna Dr. Raul Piaggio Blanco" (Ministerio de Salud Pública) Hospital Pasteur, Montevideo.

Leido en el Cuarto Congreso Nacional de Cirugia, Montevideo, Uruguay, Diciembre de 1952.

Este trabajo forma parte de una monografía sobre "Equinococosis Cardíaca" hecha pública recientemente por los mismos autores.

mento actual, hemos tenido oportunidad de ver cinco nuevos casos de dicha afección. De esos cinco casos tres han sido estudiados angiocardiógráficamente.^{7, 8, 9}

Esta comunicación al Congreso de Cirugía resume nuestra experiencia en este tema, basada en la observación de cinco casos.

OBSERVACIONES

Observacion N° 1.¹

P. S. 43 años. Sexo masculino. Procedente del Departamento de Duizno, ingresa en agosto de 1951 al Servicio de Cirugía Torácica del Prof. Dr. Víctor Armand Ugón por una tumefacción paracardiaca. Estudiado desde los puntos de vista clínico, radiológico y electrocardiográfico, se llega al diagnóstico de quiste hidático del ventrículo izquierdo y se le opera. Antes del acto quirúrgico, que confirmó el diagnóstico clínico a mostrar la presencia de un quiste hidático multivesicular localizado en la región láteroposterior del ventrículo izquierdo, un estudio angiocardiógráfico nos había mostrado la perfecta integridad del perfil interno de dicha cámara cardiaca. (Fig. 1).

P. S. Obs. N° 1. — Levoangiocardiógrama.

Observacion N° 2.²

P. C., 24 años. Sexo masculino. Procedente del Departamento de Treinta y Tres, llega en setiembre de 1951 al Servicio de Cirugía del Prof. Dr. Pedro Larghero Ybarz, para ser estudiado por una sombra paracardiaca izquierda que se pensó —en un primer momento— debida a un

quistes hidáticos pulmonares. Estudiado en forma detallada, se pensó que la sombra anormal que presentaba el paciente era debida a un quiste hidático ventricular izquierdo por la comprobación de anomalías radiológicas y electrocardiográficas. Esta impresión se vio reforzada por un estudio angiocardíaco, que mostró una amputación franca del perfil interno del ventrículo en la zona apéxica. (Fig. 2). La intervención quirúrgica

P. C. Obs. N° 2. Levoangiocardiógrama.

llevada a cabo por el Prof. Agdo. Dr. Luis M. Bosch del Marco, permitió ver un quiste hidático alterado de la región apéxica del ventrículo izquierdo que había adelgazado —en forma por demás evidente— a la pared muscular situada detrás de él.

Observación N° 3.

J. S. B., 40 años. Sexo femenino. Procedente de la Capital, ingresa en noviembre de 1951 al Servicio de Cirugía del Prof. Dr. Pedro Larghero Ybarz por una colecistitis aguda. En un examen radioscópico de tórax se le descubre una deformación en la región alta del ventrículo izquierdo que, además, presenta un halo de calcificación. Los estudios complementarios de la paciente confirman la sospecha de que se trata de un quiste hidático cardíaco y el levoangiocardiógrama (Fig. 3) nos muestran un defecto en el relleno del perfil interno del ventrículo izquierdo frente a la línea de calcificación. Operada esta paciente por el Prof. Larghero Ybarz, se cae sobre un quiste hidático alterado de la zona antedicha que había adelgazado en forma muy notable al miocardio subyacente.

J. S. B. - Obs. N° 3
Levoangiocardio
grama

Observación N° 4.

A. C., 33 años. Sexo femenino. Procedente de la Capital. En un examen de colectividades se le comprueba una deformación cardíaca en la zona del ventrículo izquierdo que, estudiada cuidadosamente, impresiona como debida a la presencia de un quiste hidático, desarrollado en las capas superficiales del miocardio y evolucionado hacia la cavidad pericárdica. Un estudio angiocardiógráfico muestra la integridad del límite interno del ventrículo izquierdo. (Fig. 4). Operada esta paciente por el Dr. Anibal Sanjinés, en octubre ppdo., se encuentra un quiste hidático alterado y se confirman todas las predicciones referentes a la localización del quiste y a su implantación miocárdica superficial.

Observación N° 5.

J. C., 11 años. Sexo masculino. Procedente de la ciudad de Zaragoza (España). En un examen de masas, practicado por la Cruzada Antituberculosa, se le descubre una deformidad cardíaca — completamente asintomática— en la region del ventrículo izquierdo. Teniendo en cuenta nuestra experiencia anterior, se piensa en un quiste hidático del ventrículo izquierdo que, por la información suministrada por el estudio electrocardiográfico, se cree implantado en las capas superficiales del miocardio. Esta impresion se ve confirmada por un estudio angiocardiógráfico, que nos ofrece un levoangiocardiógrama normal. (Fig. 5). Los padres del paciente no aceptaron la intervención quirúrgica que les fue propuesta.

A. C. Obs. Nº 4
Levoangiocardiógrama

J. C. Obs. Nº 5
Levoangiocardiógrama

DISCUSION

Así como el estudio radiológico no contrastado (fluoroscopia, radiografías, tomografías, kimogramas) es de una enorme utilidad para analizar las deformaciones localizadas que causa un quiste hidático cardiaco en el perfil externo de dicho órgano, la angiocardigrafía tiene el mérito de poner en evidencia el perfil interno de las cámaras cardíacas y las deformaciones que le imprimen los quistes que se desarrollan en el espesor de sus correspondientes paredes y que tienen, sobre todo, una evolución centripeta.

Sabemos que el quiste hidático, de asiento primitivamente intersticial en el miocardio, puede ocupar tanto las capas superficiales del mismo como comenzar su evolución expansiva, encontrándose cerca del endocardio.^{10, 11}

Cuando el embrión hexacanto, que ha llegado al miocardio por el sistema coronario, se localiza en las capas subepicárdicas o relativamente superficiales de dicho tejido, es lógico que —en su proceso de crecimiento— evolucione hacia la cavidad pericárdica. Al hacerlo así y al haber asentado primitivamente en las capas superficiales del músculo ventricular izquierdo, fácil es explicarse el por qué no modifique para nada el perfil interno de dicha cámara cardíaca. Entre la adventicia quística y el endocardio queda una capa de músculo ventricular lo suficientemente gruesa como para contrarrestar la presión que ejerce el quiste. Tal es el caso de nuestras observaciones N° 1, N° 4 y N° 5. Los estudios electrocardiográficos correspondientes nos habían hecho pensar que el grosor de la pared ventricular —en la zona donde las alteraciones de la onda T eran más claras— era considerable, ya que el voltaje de los accidentes QRS era prácticamente normal. La intervención quirúrgica se encargó de demostrar —en las observaciones N° 1 y N° 4— lo acertado de ambas conclusiones, al comprobar que el quiste asentaba sobre una pared muscular gruesa y que su evolución había sido hacia la cavidad pericárdica.

Cuando el quiste hidático ventricular no es primitivamente tan superficial, tiene muchas más probabilidades de deformar —en su proceso de crecimiento— el perfil interno del ventrículo, siempre que alcance a tener ciertas dimensiones. Cuando, por esta última causa, llega a deformar el perfil externo del ventrículo,

lo, el diagnóstico angiocardiógráfico se ve considerablemente facilitado. Tal fué lo que sucedió con dos de nuestros casos (observaciones N° 2 y N° 3).^{2, 7} En uno de ellos la deformación del perfil externo presentaba, además, un halo de calcificación, detalle éste que vino a reforzar aún más la impresión diagnóstica del principio.

Esta deformación del perfil interno de la cámara cardíaca es debida a la presión que ejerce el quiste hidático sobre una capa muscular delgada que se interpone entre él y la cavidad endocárdica. Esto fué previsto en nuestros dos casos, gracias a la información que nos dieran los correspondientes electrocardiogramas (ondas R y complejos QRS de muy bajo voltaje en las posiciones precordiales en las que las alteraciones de las ondas T eran más llamativas) y confirmado días más tarde en el acto quirúrgico.

Cuando se observe una deformación del perfil interno del ventrículo izquierdo en todo caso sospechoso de quiste hidático, hay que pensar que el quiste lleva —en sí— la tendencia a romperse en la cavidad de dicha cámara. Este es un dato más —y de importancia— para urgir la sanción quirúrgica del caso.

Después de la experiencia feliz que hemos recogido en este sector del diagnóstico de la equinocosis del ventrículo izquierdo, estamos en inmejorables condiciones como para aconsejar el empleo sistemático de la angiocardiógrafía en el estudio de todo caso que presente una deformación del perfil externo del ventrículo izquierdo. Reconocemos que este medio de diagnóstico auxiliar está en condiciones de proporcionar una información de gran valor y que los riesgos que corren los pacientes con la aplicación de esta técnica son mucho menores que los que les puede acarrear un error de diagnóstico de una afección que, como la equinocosis cardíaca, ha entrado de lleno en el capítulo del tratamiento quirúrgico.

Frente a toda deformación del perfil externo del ventrículo izquierdo, el clínico que la descubre piensa siempre —por razones de mayor frecuencia— en un aneurisma del ventrículo. Sabemos que algunos infartos pasan inadvertidos en el momento de su instalación, factor éste que predispone a la producción ulterior de un aneurisma ventricular, sobre todo en personas que llevan una vida activa e que, por razones de insania mental, no observan el reposo necesario durante las primeras semanas de

evolución de un infarto perfectamente reconocido. Datos anatómopatológicos bien confrontados con la evolución clínica de los infartos y con las rupturas cardíacas^{12, 13, 14} hablan a favor de la intervención nefasta de esos dos factores en la producción de aneurismas ventriculares.

Lo que antes se pensaba era una enfermedad de la edad madura o de la edad provectora, hoy debe ser aceptado como una contingencia posible en gente joven.¹⁵ Este detalle complica el capítulo del diagnóstico diferencial entre los aneurismas y los quistes hidáticos del ventrículo, así como lo complican también los aneurismas que se calcifican.^{16, 17}

En trabajos recientes varios autores^{18, 20} insisten en la relativa frecuencia de los aneurismas ventriculares (9.9% en la serie de 99 pacientes estudiados por Ford y Levine y fallecidos a consecuencia de un infarto miocárdico) e invitan a los clínicos a estudiar más a fondo a los pacientes que han tenido una oclusión coronaria, en busca de dicha complicación.

Es muy raro, por el contrario, que —en nuestro ambiente— se piense en un tumor cardíaco frente a una alteración del perfil del ventrículo izquierdo. Las pocas observaciones conocidas fueron todas hallazgo de autopsia.

Quiere esto decir que, cuando en nuestro medio, se verifica una deformación ventricular incuestionable por medios radiológicos, habrán de aguzarse todos los sentidos y habrán de emplearse todos los medios de diagnóstico complementarios que se juzguen necesarios para establecer el diagnóstico de un aneurisma ventricular o de un quiste hidático que haga saliente en la cavidad pericárdica.

No vamos a discutir aquí las características clínicas y radiológicas de los aneurismas del ventrículo izquierdo, ya que aparecen muy bien estudiadas en el libro de Laubry y Soulié.²¹ Tampoco vamos a referirnos a su perfil electrocardiográfico, ya que lo hemos analizado en publicaciones anteriores.^{22, 23}

Vamos, eso sí, a tratar de establecer las bases del diagnóstico angiocardiógráfico diferencial entre los aneurismas y los quistes hidáticos del ventrículo izquierdo.

Recordando todo lo que acabamos de decir respecto al perfil angiocardiógráfico de esta última afección, veremos que —al reproducir las manifestaciones de Dotter y Steinberg—²⁴ los aneu-

rismas ventriculares tienen una expresión angiocardiográfica bien diferente.

Dicen estos autores: "La angiocardiografía facilita el diagnóstico de esta afección, al mostrar que la sustancia de contraste acusa la presencia de una saliente aneurismática de la cámara del ventrículo izquierdo. Se ve con frecuencia una pared ventricular anormalmente fina en el lugar donde se ha producido previamente un infarto miocárdico. En casos como estos puede ser difícil decidir si existe un verdadero aneurisma ventricular o si existe un reemplazo de la pared muscular por un tejido fibroso, aunque debemos decir que la decisión referente a la terminología tiene —más que nada— un interés académico. La cavidad ventricular izquierda en ambas situaciones está habitualmente dilatada y su aspecto angiocardiográfico es el de una diástole perpétua, rasgo éste que reviste importancia. Con cierta frecuencia puede ser demostrada la presencia de un trombo en el interior de los aneurismas ventriculares".

Doll, Dotter y Steinberg¹⁵ manifiestan, en su artículo reciente, que la angiocardiografía revela pocas diferencias entre los aneurismas ventriculares pequeños y el aspecto que ofrece el ventrículo izquierdo a consecuencia de un infarto masivo, ya que —en esta última situación— el ventrículo también parece estar en diástole perenne. Dicen que la diferencia angiocardiográfica principal entre los infartos miocárdicos masivos y los aneurismas ventriculares es la saliente localizada del perfil interno de la cámara cardíaca antedicha.

Estas descripciones difieren notablemente —como podemos ver— de lo que nosotros hemos podido sorprender en el estudio de nuestros cinco casos de equinocosis.

En ninguno de ellos se sorprendió una dilatación de la cavidad ventricular. Por el contrario, **en dos existía una amputación clara del perfil interno del ventrículo, mientras que —en los tres restantes— el perfil mantenía un aspecto normal.**

Tampoco llegamos a percibir una imagen de diástole ventricular perpétua en ninguno de nuestros casos. La imagen ventricular ofrecióse siempre diferente en las exposiciones sucesivas, logradas a intervalos de un segundo.

RESUMEN

Los autores relatan su experiencia basada en el estudio angiocardiógráfico de cinco casos de equinococosis del ventrículo izquierdo y reconocen que este método auxiliar de diagnóstico es de real utilidad en situaciones como éstas.

Piensen que, conjuntamente con el estudio electrocardiográfico, es un método que brinda una exacta información acerca del grosor de la pared miocárdica interpuesta entre el quiste y la cavidad endocárdica. Cuando el perfil interno del ventrículo izquierdo muestra alteraciones francas, hay que pensar que el quiste ha asentado en las capas relativamente profundas del miocardio ventricular y que lleva en sí la tendencia a abrirse en la luz de dicha cámara cardíaca. Cuando se comprueba la absoluta integridad de dicho perfil, debe pensarse que el quiste ha evolucionado preterentemente hacia la cavidad pericárdica y que existe una pared muscular de espesor considerable por detrás de él.

Hacen hincapié en la diferencia que existe entre el perfil angiocardiógráfico de la equinococosis del ventrículo izquierdo y el perfil a que dan origen los aneurismas ventriculares.

SUMMARY

The authors report their experience on the angiocardigraphic study of five cases of echinococosis of the left ventricle, and state that this method has proved to be very useful in the handling of such cases.

Angiocardigraphy, as well as electrocardiography, gives a very accurate information as far as the thickness of the ventricular wall underlying the cyst is concerned. Localized deformities in the internal outline of the left ventricle mean that the hydatid cyst has developed close to the deep layers of the muscular wall, showing a tendency to rupture in to the lumen of this cardiac chamber. On the contrary, the integrity of the internal outline signifies that the cyst has developed mainly towards the pericardial cavity.

The differential diagnosis between the angiocardigraphic pattern of aneurysms and hydatid cyst of the left ventricle is also established by the authors.

BIBLIOGRAFIA

- 1.— **Armand Ugon, V.; Piaggio Blanco, R. A.; Mezzera, J. R.; Aguirre, C. V. y Purcallas, J.**— Quiste hidático del ventrículo izquierdo operado. *Rev. Tuberc. Uruguay*, **19**: 57, 1951.
- 2.— **Bosch del Marco, L. M.; Canabal, E. J.; Dighiero, J.; Baldemir, J. M.; Suzacq, C. V. y Antiga, P. F.**— Quiste hidático del corazón localizado en el ventrículo izquierdo. Operación. *Curacion. Arch. Urug. Med., Cir. Especialid.* **41**: 159, 1952. *Boi. Soc. Cir. Uruguay*, **22**: 576, 1951.

- 3.— **Sapriza, J. P. y Armand Ugon, V.**— Observacion inédita.
- 4.— **Canabal, E. J.; Dighiero, J.; Suzacq, C. V.; Aguirre, C. V.; Purcallas, J. y Baldomir, J. M.**— Historia de la equinococosis cardíaca en el Uruguay. *An. Fac. Med. Montevideo*, 38: 465, 1953.
- 5.— **Pérez Fontana, V. y Sapriza, J. P.**— Quiste hidático hialino del ventrículo izquierdo. *Arch. Intern. Hidatidosis*, 13: 157, 1953.
- 6.— **Crafoord, C.; Armand Ugon, V.; Purriel, P. y Sapriza, J. P.**— Observación inédita.
- 7.— **Larghero Ybarz, P.; Dighiero, J.; Purcallas, J.; Canabal, E. J.; Aguirre, C. V.; Baldomir, J. M. y Michetti, C. A.**— Equinococosis del ventrículo izquierdo. Un nuevo caso operado. Por publicarse.
Horjales, J. O.; Michetti, C. A.; Dighiero, J.; Suzacq, C. V.; Aguirre, C. V.; Canabal, E. J.; Purcallas, J.; Hazan, J.; Scremini Algorta, P. y Baldomir, J. M. Dos nuevas observaciones de equinococosis del ventrículo izquierdo. Por publicarse.
- 9.— **Canabal, E. J.; Dighiero, J.; Aguirre, C. V.; Baldomir, J. M.; Purcallas, J.; Suzacq, C. V. y Horjales, J. O.** Equinococosis cardíaca. Trabajo presentado al Premio Soca (1952-1954) de la Facultad de Medicina de Montevideo.
- 10.— **Morquio, L.**— Kyste hydatique primitif du myocarde ouvert dans le ventricule gauche; hydatose metastatique avec neuf kystes dans le cerveau et deux kystes dans la rate. *Arch. Méd. Enfants*, 37, 90, 1934.
- 11.— **Schroeder, A. H. y Medoc, J.**— Quistes hidáticos del cerebro, corazón y riñón. *An. Inst. Neurol. Montevideo*, 4-5: 263, 1942-1943.
- 12.— **Mallory, G. K.; White, P. D. and Salcedo Salgar, J.**— The speed of healing of myocardial infarction. *Am. Heart J.*, 18: 647, 1939.
- 13.— **Lodge-Patch, I.**— The ageing of cardiac infarcts and its influence on cardiac rupture. *Brit. Heart J.*, 13: 37, 1951.
- 14.— **Wang, C. H.; Bland, E. F. and White, P. D.**— A note on coronary occlusion and myocardial infarction found postmortem at the Massachusetts General Hospital during the 20 year period from 1926-1945. *Ann. Int. Med.*, 29: 601, 1948.
- 15.— **Dolly, C. H.; Dotter, C. T. and Steinberg, I.**— Ventricular aneurysm in a 29-year-old man studied angiocardiographically. *Am. Heart J.*, 42: 894, 1951.
- 16.— **Heim de Balsac, R. et Marquis, C.**— Un nouveau cas d'anévrysme du cœur calcifié. *Arch. Mal. Coeur*, 34: 283, 1941.
- 17.— **Bogoch, A., and Christopherson, E. F.**— Calcified cardiac aneurysm. *Ann. Int. Med.*, 32: 295, 1950.
- 18.— **Ford, R. V. and Levine, H. D.**— Electrocardiographic clue to ventricular aneurysm. *Ann. Int. Med.*, 34: 998, 1951.

- 19.— **Guzman de la Garza, C.**— Aneurismas del corazón. Arch. Inst. Cardiol. México, 21: 339. 1951.
- 20.— **East, T. and Oram, S.**— The cardiogram in ventricular aneurysm following cardiac infarction. Brit. Heart J., 14: 125. 1952.
- 21.— **Laubry, C. et Soulie, P.**— Maladies des arteres coronaires. Masson et Cie. Paris, 1949.
- 22.— **Canabal, E. J.**— Quiste hidático cerrado del ventrículo izquierdo. Su perfil angiocardiógráfico y electrocardiógráfico. Trabajo de Adscripción. Facultad de Medicina de Montevideo, 1951.
- 23.— **Baldomir, J. M.; Canabal, E. J.; Dighiero, J.; Purcallas, J.; Aguirre, C. V. y Suzacq, C. V.**— Valor del electrocardiograma para establecer el diagnóstico entre los aneurismas y los quistes hidáticos del ventrículo izquierdo. Arch. Urug. Med., Cir. Especialid., 42: 273, 1953.
- 24.— **Dotter, C. T. and Steinberg, I.**— Angiocardiography. Annals of Roentgenology, Vol. XX. Paul B. Hoeber. New York, 1952.

Sr. COORDINADOR.— Tienen la palabra los Dres. J. P. Sapriza, J. L. Duomarco, R. Rimini y G. H. Surraco.

ESTUDIO ANGIOCARDIOGRAFICO EN 120 CASOS DE CARDIOPATIAS CONGENITAS

Dres. J. P. Sapriza, J. L. Duomarco, R. Rimini y G. H. Surraco.

La cirugía cardiovascular, de tan intenso desarrollo en los últimos años, ha tenido en la angiocardiógrafa un apoyo de importancia creciente. De hecho, antes de la era quirúrgica, tenía un valor relativo el diagnóstico exacto de las cardiopatías congénitas; ahora, frente a la posibilidad de variar por medio de intervenciones cruentas el futuro del enfermo, adquiere una importancia enorme hacer dicho diagnóstico con exactitud; lo que a menudo es posible.

Las bases de este progreso radican en las grandes realizaciones de Abbot¹ en la patología y de Taussig² en la clínica; pero es indudable que el impulso extraordinario que ha experimentado el estudio sistemático de cada caso particular, hasta llegar a un diagnóstico detallado y de gran posibilidad, se debe en gran parte a la obra de Castellanos, Pereiras y García,³ de Robb y

Steinberg¹ y de sus continuadores, por haber puesto al alcance del médico práctico el método angiocardiógráfico. El nos da, en efecto, un documento que, aunque sujeto a interpretación y no exento por consiguiente de conclusiones erróneas, tiene un valor superior al de la exploración quirúrgica y se aproxima en general al de una confirmación necrópsica.

En el año 1948, nos propusimos poner en práctica dicha investigación diagnóstica; aprendimos la técnica en el extranjero y pudimos efectuar las primeras angiocardiógrafías en el País (las segundas en Sudamérica), comunicando nuestros resultados en los centros de enseñanza nacionales y extranjeros^{5,6,7,8,9,10,11, 12,13 y 14}.

La angiocardiógrafía nos ha permitido estudiar un número relativamente elevado de enfermos con cardiopatías congénitas, que presentamos a la consideración de este Congreso. Los 120 casos que forman este material son pocos con relación a la casuística de algunos trabajos extranjeros, pero representan el aporte casi total de nuestro país a este tema.

Creemos que la tabla que vamos a analizar a continuación, permite apreciar la incidencia con la cual se presentan las distintas cardiopatías congénitas en nuestro país, ya que las proporciones relativas de las diferentes malformaciones cardíacas guardan razonable semejanza con las series ya clásicas de otros países.

Se realizaron 358 angiocardiógrafías, sin accidentes de importancia, de las cuales 134 en 123 casos sospechosos de cardiopatías congénitas. 3 exámenes fallaron por error de técnica radiográfica, quedando utilizables 120 casos

SEXO: Femenino 54; Masculino 66.

EDAD: desde 3 meses hasta 6 años	37 casos
entre 6 y 12 años	33
entre 12 y 18 años	22
más de 18 años	28

Total: 120

DIAGNOSTICO

Normales o dudosos	4 casos
Ducto arterioso: 33 casos	
Puro	25
Con comunicación interauricular	4
Con estenosis de la Art. Pul. y comunicación interauric.	1
Con tetralogía de Fallot	3
Comunicación interauricular: 30 casos	
Pura	18
Con vena cava Sup. Izq.	1
Con ducto arterioso	4
Con estenosis de la Art. Pul. y ducto arterioso	1
Con estenosis mitral (Lutembacher)	5
Con estenosis tricuspídea	1
Tetralogía de Fallot: 21 casos	
Típica	14
Con aorta a la derecha (variedad de Corvisart)	4
Con ducto arterioso	2
Con aorta a la derecha y ducto arterioso	1
Aorta a la derecha: 6 casos	
Pura	1
Con tetralogía de Fallot	5
Coartación de la aorta (tipo adulto)	4
Dilatación idiopática de la Art. Pul.	7
Comunicación interventricular: 8 casos	
Roger	6
Defecto septal alto	2
Ventrículo único	2
Tronco arterioso común: 4 casos	
Puro	3
Con dextrocardia	1
Estenosis de la Art. Pul.: 4 casos	
Pura	3
Con comunicación interauricular y ducto arterioso ...	1
Estenosis mitral, con comunic. interauric. (Lutembacher) ..	5
Estenosis tricuspídea, con comunicación interauric.	1
Mesocardia	3

Dextrocardia: 2 casos

Pura	1	1
Con tronco común	1	1
Corazón bilocular	1	1

● **P E R A D O S**

Diagnóstico	Nº de casos	Mortalidad
Ducto arterioso	22	0
Tetralogía de Fallot	6	3
Coartación de la aorta	2	

Noviembre 30 de 1953.

BIBLIOGRAFIA

- 1.— **Abbot, M. E.**— Atlas of Congenital Heart Disease. New York. American Heart Ass., 1936.
- 2.— **Taussig, H. B.**— Congenital Malformations of the Heart. New York. Commonwealth Fund., 1947.
- 3.— **Castellanos, A.; Pereiras, R. et Garcia, A.**— L'angiocardigraphie chez l'enfant. "Presse Médicale", pág 1474. 1938.
- 4.— **Robb, G. P. and Steinberg, I.**— Visualization of the chambers of the heart, the pulmonary circulation and great blood vessels in man: a practical method. J. Clin. Investigation, 17, 507. 1938.
- 5.— **Duomarco, J. L.; Rimini, R.; Sapriza, J. P. y Surraco, G. H.**— Intento de apreciación de la presión venosa efectiva por medio de la angiocardigrafía. Rev. Arg. de Cardiología, 17, 15, 1950.
- 6.— **Sapriza, J. P.; Duomarco, J. L.; Rimini, R. y Surraco, G. H.**— La angiocardigrafía. "El Día Médico Uruguayo", 17, enero 1950.
- 7.— **Rimini, R.; Burgos, R.; Duomarco, J. L.; Rodriguez, A.; Sapriza, J. P. y Surraco, G. H.**— Estudio comparativo entre la angioneumografía y la broncoespirometría. Terceras Jornadas Argentinas de Cirugía Torácica, pág. 233. junio de 1950; Hoja Tisiológica, 10, 255 1950.
- 8.— **Rimini, R.; Rodriguez, A.; Burgos, R.; Duomarco, J. L.; Sapriza, J. P. y Surraco, G. H.**— Contributo dell'angiopneumografia ad alcuni problemi di fisiopatologia polmonare. Atti del Primo Congresso Internazionale dell'American College of Chest Physicians, Roma, Settembre 1950, pág. 152; Diseases of the Chest, 22, 539, 1952.
- 9.— **Rimini, R.; Rodriguez, A.; Sapriza, J. P. y Surraco, G. H.**— Estudio angioneumográfico de diversos procesos patológicos del pulmón. Hoja Tisiológica, 10, 378. 1950.
- 10.— **Duomarco, J. L.; Rimini, R.; Sapriza, J. P. y Surraco, G. H.**— Le phenomene du collapsus dans les grandes veines du thorax; Communication al 1er. Congrès Mondial de Cardiologie, Paris, setiem

bre de 1950, tomo II, pág. 612. Cuore e Circolazione, Roma, 35, 156, 1951.

- 11.— **Rimini, R.; Sapriza, J. P.; Ducmarco, J. L. y Surraco, G. H.**— Angiocardioneumografía. Cuartas Jornadas Argentinas de Cirugía Torácica y Primeras Jornadas Latino Americanas del Tórax. Buenos Aires, Julio de 1951, pág. 17.
- 12.— **Sapriza, J. P.; Duomarco, J. L.; Rimini, R. y Surraco, G. H.**— Estudio principalmente angiocardiógráfico de una serie de 62 casos de cardiopatía congénita. Comunicación al III Congreso Panamericano de Pediatría, Montevideo, Diciembre de 1951. Arch. Urug. de Med. Cir. y Esp., 40: 292, 1952.
- 13.— **Rimini, R. y Rodríguez, A.**, con la colaboración de **Sapriza, J. P. y Surraco, G. H.**— La Angioneumografía en la tuberculosis pleuropulmonar: Hoja Tisiológica, 12, Nº 1, 1952. Monografía Nº 6 de la Colección del Instituto de Tisiología de la Facultad de Medicina de Montevideo; Soc. Ed. "Universo", Roma, 1952.
- 14.— **Rimini, R.; Duomarco, J. L. y Burgos, R.**— La funzione respiratoria studiata nella tubercolosi polmonare per mezzo dell'angioneumografia, Lotia contro la Tuberculosis, 22, 1007, 1952.